

Gyromitra parma

(J. Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar,
Česká Mykol. 28(2): 91 (1974)

Ordre **Pezizales** - Famille **Discinaceae**

par Gilbert Moyne



Photo JM Moingeon

Description

Caractères macroscopiques

Apothécies courtement stipitées, d'abord plus ou moins cupuliformes puis étalées, bosselées, ridées, à marge convexe, 3-5 cm de diamètre, 1-3 cm de haut. Hyménium ocre brun assez clair fonçant avec l'âge et la vétusté. Surface externe plus pâle, poudrée de blanc tout comme le stipe qui est dans le prolongement de l'excipulum avec quelques larges côtes qui s'anastomosent.

Caractères microscopiques

Asques 350-400 x 18-25 μm , cylindracés, un peu atténués à la base qui se termine sans qu'on puisse distinguer nettement des crochets, à sommets non amyloïdes, operculés, contenant huit spores unisériées.


Paraphyses cylindracées, dressées, très courtement cloisonnées, un peu renflées au sommet (8-10 μm), à contenu granuleux brunâtre.

Spores ellipsoïdales à parfois un peu fusiformes, hyalines, contenant une grosse goutte centrale accompagnée de deux autres plus petites ou de plusieurs autres, ornées d'un réseau assez régulier aux mailles hexagonales, peu élevé mais plus épais aux connections. Les extrémités sont munies de plusieurs (3-5) épines de 2-3 μm de long. Les spores mesurent 22-27 x 12-15 μm .

Chair épaisse à excipulum ectal de textura intricata.

Habitat et récoltes : apport Pierre Chaillet en provenance de l'exposition FME de Raddon-et-Chapendu (70), récoltée à Kembs, Haut-Rhin, . 23/04/2015 - leg. Jacques Grandhay.

Remarques : l'espèce était anciennement rangée dans les *Discina*. Les spores sont un peu courtes par rapport à la littérature consultée mais l'ornementation ne laisse aucun doute. Elle ne semble jamais avoir été signalée en Franche-Comté.



Gyromitra parma a- coupe, b- spores, c- sommets d'asques et paraphyses, d- bases d'asques.

Bibliographie :

Breitenbac & Kränzlin ,
champignon de Suisse, tome 1
Ascomycètes N° 30 p) 62

Peric B. & O. - 2005- *Discina
parma*, nouvelle espèce de la
flore mycologique du
Montenegro. Revue du Cercle
Mycol. de Bruxelles 5 : 9-18

Röllin O. - 1993 - *Discina
parma* trouvée en Haute-
Savoie. Bull. Trim. Féd. Mycol.
Dauphinée-Savoie 121 : 4-6

**Van Vooren, N. & Moreau, P.-
A., 2009.** — Essai taxinomique
sur le genre *Gyromitra* Fr. sensu
lato (Pezizales), 4. Le genre
Gyromitra Fr., sous-genre
Caroliniana. Ascomycete.org,
1(2): 15-20.



Gyromitra parma

Ile du Rhin, sur tronc mort de peuplier à terre.
Photo JL Muller