# EXPOSITION DE CHAMPIGNONS PRESENTEE LE DIMANCHE 05 OCTOBRE 2025

#### **A LUTTERBACH**

# PAR LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)

(Samedi 04 octobre 2025 : préparation de la salle)

# 4EME PARTIE LICHENS

Lichens récoltés par Antoine BRESCIANI, Marc JOLY, Sylvie PERRIN-BLANCHARD et Bernadette THOUVENOT

Lichens déterminés par Antoine BRESCIANI et Marc JOLY

(Textes de Marc JOLY)

Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX

Sauf mentions contraires « Photos réalisées par Marc JOLY » : Parmelia ernstiae (1 photo) et Physcia adscendens (2 photos)



Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., 1804 - Baeomycetales - Baeomycetaceae

Au sol ou sur pierre acide.

Thalle granuleux gris-vert.

Apothécies brun clair en béret, avec un petit pied plein.

(Provenances : Athesans 70 - 02.10.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Calicium quercinum Pers., 1797 - Caliciales - Physciaceae

# Nouveauté alsacienne

#### Lichen crustacé :

Thalle verdâtre granuleux. Petites apothécies noires stipitées env. 0,5 – 1mm. Thalle K+ jaune puis rouge.


(Provenance : Richwiller 68 - 03.10.2025 - Récolte de Antoine Bresciani)



Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., 1827 Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions à scyphe en entonnoir. Non perforé, soralies granuleuses. Souvent proliférant par le bord. Squamules fréquentes. Brun à vert. Apothécies et pycnides brunes. K-; P + rouge

(Provenances: Faverney 70 – 22.09.2025 & Firstacker 68 - 03.10.2025)



Cladonia ciliata var tenuis (Flörke) Ahti, 1977 - Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions grêles diamètre 1 – 2mm, décortiqués, extrémités très fines, courbées dans 1 sens. Squamules totalement absentes. Jaune paille très clair. P+ rouge, K-, KC+ jaune.



Cladonia coccifera (L.) Willd., 1787 - Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions à scyphe non perforé. Squamules sur toute la hauteur. Apothécies rouges assez grosses, et pycnides au bord des scyphes. K-; P-


(Provenances : Faverney 70 - 22.09.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., 1827 - Lecanorales - Cladoniaceae


Thalle primaire squamuleux abondant. Podétions simples en alène (pas de scyphes) K+ brun

(Provenances: Faverney 70 - 22.09.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., 1827 - Lecanorales - Cladoniaceae

(Provenances : Faverney 70 - 22.09.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Cladonia digitata (L.) Hoffm., 1796 - Lecanorales - Cladoniaceae

Thalle primaire à grandes squamules.

Podétions simples issus du centre d'une squamule, non squamuleux scyphes à apothécies rouges.

K+ jaune puis brun rouge; P+ orangé.

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025)



Cladonia fimbriata (L.) Fr., 1831 - Lecanorales - Cladoniaceae

Thalle vert tendre. Podétions à surface finement sorédiée. Scyphe brusquement rétréci à sa base.

(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Cladonia furcata ssp furcata morph furcata - Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions verts à ramifications bifides. Extrémités bifides effilées. Souvent fendu longitudinalement. Squamules toujours présentes, +/- nombreuses. K-, P+ rouge.


(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025)



Cladonia furcata ssp furcata morph pinnata - Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions verts à ramifications bifides. Extrémités bifides. Souvent fendu longitudinalement. Squamules toujours très nombreuses. Grosses apothécies brunes.

K-, P+ rouge



Cladonia furcata ssp subrangiformis (L. Scriba ex Sandst.) Pišút, 1961 Lecanorales - Cladoniaceae

Thalle en « peau de girafe ». Rameaux perforés. Quelques squamules à la base. K+ jaune puis brun, UV-



Cladonia furcata ssp subrangiformis (L. Scriba ex Sandst.) Pišút, 1961 Lecanorales - Cladoniaceae



Cladonia glauca Flörke, 1828 - Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions brun-grisâtres, simples soralies grossières mêlées de squamules sur toute la hauteur.

Scyphes étroits, perforés.

K-, P-



Cladonia macilenta Hoffm., 1796 - Lecanorales - Cladoniaceae

Thalle primaire squamules gris-vert.
Podétions en alène sans scyphes.
Parfois divisés.
Squamuleux à la base.
Apothécies rouges minuscules.
P+ orange, K+ jaune vif.



Cladonia ochrochlora Flöke, 1827 - Lecanorales - Cladoniaceae

Thalle primaire persistant, squamules 5-12mm. Podétions robustes non ramifiés, haut 6-7cm, en alène ou à scyphes très étroits. Base des podétions K+ jaune brun Podétions P+ rouge, K-



Cladonia peziziformis (With.) J.R. Laundon, 1984 Lecanorales - Cladoniaceae Nouveauté alsacienne

Thalle squamuleux, à squamules très découpées, imbriquées en coupe, Apothécies brunes en forme de clou, guère plus hautes que le thalle K+ jaune puis brun rouge.

(Provenance: Firstacker 68 - 03.10.2025)



Cladonia phyllophora Hoffm., 1796 - Lecanorales - Cladoniaceae


Podétions fins, ramifiés. Squamuleux jusqu'aux scyphes. Scyphes étroites proliférant par le bord. Petites apothécies brunes.



Cladonia portentosa (Dufour) Coem., 1865 - Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions vert pâle, blanchâtres. Non cortiqués, divisés par 3 à 4. Pas de squamules. Petites apothécies brunes. K-

(Provenances: Faverney 70 - 22.09.2025 & Ballon d'Alsace - 03.10.2025)



Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon, 1984 Lecanorales - Cladoniaceae


Podétion granuleux à squamuleux. Déformés, rameux. Scyphes proliférants ou absents. Apothécies brunes assez grosses. K- ou faible, P+ rouge.



Cladonia rangiferina (L.) Weber, 1780 - Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions gris clair, décortiqués. Ramifié par 2 à 3 (4), formant un tronc. Extrémités courbées dans 1 sens. Petites apothécies brunes aux extrémités. P+ rouge, K+ jaune puis brun.

(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Cladonia rangiformis Hoffm., 1796 - Lecanorales - Cladoniaceae

Cortiqué panaché vert et blanc. Divisé par 2, extrémités fourchues souvent brunes. Toujours quelques squamules. Petites apothécies brunes. K+ jaune.

(Provenances: Faverney 70 - 22.09.2025 & Ballon d'Alsace - 03.10.2025)



Cladonia rangiformis Hoffm., 1796 - Lecanorales - Cladoniaceae

(Provenances : Faverney 70 - 22.09.2025 & Ballon d'Alsace - 03.10.2025)



Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm., var. squamosa, 1796 Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions entièrement couverts de squamules. Scyphes étroites perforées Petites apothécies brunes.


(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Cladonia subulata (L.) Weber ex. F.H. Wigg., 1780 Lecanorales - Cladoniaceae

Podétions brun-grisâtres, simples soralies sur toute la hauteur. Squamules rares. Scyphes étroits non perforés.

K-, P+ rouge.



Cladonia symphycarpa (Flörke) Fr., 1826 Synonyme: Cladonia symphycarpia (Ach.) Fr., 1826 Lecanorales - Cladoniaceae

Thalle primaire en coussin.
Squamules arrondies brun vert.
Podétions absent ou très rares.
Sans scyphes, apothécies brunes.
P+ orange, K+ jaune à brun rouge.



Dibaeis baeomyces (L.f.) Rambold & Hertel, 1993 Pertusariales - Icmadophilaceae

Au sol ou sur pierre acide. Thalle granuleux gris-vert. Apothécies rose portée par un petit pied blanc haut 2 - 5mm.

(Provenance : Cuve 70 - 22.09.2025)



Evernia prunastri (L.) Ach., 1810 - Lecanorales - Parmeliaceae

### Lichen fruticuleux:

Thalle en lanières plates. Dessus vert pâle, face inférieure blanche, canaliculée.

Nombreuses soralies.

(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Faverney 70 - 22.09.2025)



Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 1986 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle vert jaune assez grand.
Surface ridée au centre.
Soralies granuleuses denses.
Face inférieure noire, brune au bord.
Cortex K- Médulle K+jaune, P+ orgé.

(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace 03.10.2025)



Glaucomaria carpinea (L.) S.Y. Kondr., Lökös & Farkas, 2019 Synonyme : Lecanora carpinea (L.) Vain, 1888 Lecanorales - Lecanoraceae

Sur écorce.

Thalle blanchâtre.

Apothécies souvent serrées déformées.

Bord thallin blanc.

Disque pruineux blanc à brunâtre.

Bord thallin P-, disque C+ jaune orangé.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Graphis scripta (L.) Ach., 1809 - Ostropales - Graphidaceae

Thalle crustacé grisâtre.

Lirelles = déchirure du thalle, noire, +/- ramifiée, extrémités arrondies avec un rebord thallin simple.

P-, K-

(Provenances : La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace 03.10.2025)




Graphis scripta (L.) Ach., 1809 - Ostropales - Graphidaceae

Thalle crustacé grisâtre.

Lirelles = déchirure du thalle, noire, +/- ramifiée, extrémités arrondies avec un rebord thallin simple.

P-, K-


(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace 03.10.2025)



Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 1896 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle gris, +/- appliqué. Lobes creux. Soralies labriformes, lobe ouvert. Face inférieure noire, brun au bord. Pas de rhizines. Médulle P+ orangé.

(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., 1918 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle gris, plutôt dressé. Lobes creux. Soralies en bouton, lobe fermé. Face inférieure noire, brune au bord. Pas de rhizines. Médulle P-

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025)



Hypotrachyna afrorevoluta (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow, 1987 Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle gris vert, peu appliqué. Soralies pustuleuses blanches à noires. Face inférieure noire, brune au bord. Rhizines noires abondantes. Cortex K+ jaune, C-, P-Médulle K-, C+ rose, P-

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025)



*Hypotrachyna revoluta* (Flörke) Hale, 1975 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle gris, appliqué. Soralies verdâtres subterminales. Face inférieure noire, brune au bord. Rhizines noires fourchues ou ramifiées. Cortex K+ jaune, C-, P-Médulle K-, C+ rose, P-

(Provenance : Athesans 70 - 02.10.2025)



Lecanora albella (Pers.) Ach., 1810 - Lecanorales - Lecanoraceae

Sur écorce. Thalle blanchâtre. Apothécies à rebord thallin blanc. Disque pruineux blanc. Disque C-, bord thallin P+ orangé.


(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Lecanora argentata (Ach.) Röhl., 1813 - Lecanorales - Lecanoraceae

Sur branche. Thalle gris à verdâtre. Hypothalle noir. Apothécies disque brun non pruineux. Rebord concolore au thalle et pourvu de gros cristaux, disque sans cristaux, Thalle K+ jaune, C-

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025)



Lecanora conizaeoides Nyl. ex. Cromb., 1885 - Lecanorales - Lecanoraceae

Sur écorce.

Thalle crustacé gris vert, grossièrement granuleux.

Apothécies à bord thallin.

Disque brun ocre.

Thalle K-, C-, P+ rouge.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Lecidea confluens (Weber) Ach., 1803 Lecideales - Lecideaceae

Thalle gris, fendillé et crevassé (parfois brun rouille). Apothécies noires (disque + bord) Sur roche non calcaire.

(Provenance : Ballon d'Alsace 03.10.2025)



# Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy, 1950 - Lecanorales - Lecanoraceae

#### Lichen crustacé :

Sur écorce.

Thalle gris vert, souvent délimité par une ligne hypothalline noire. Apothécies disque brun rouge à noir.

Rebord noir, diam jusqu'à 1 mm.

Chimie variable sur le même thalle. Spore ovale hyaline non septée.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Lepra albescens (Huds.) Hafellner, 2016 (INPN) Synonyme: Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner, 1932 Pertusariales - Pertusriaceae

Sur écorce.
Thalle blanchâtre, bord souvent zoné.
Soralies blanches, rondes.
Goût non amer.
Médulle K-, C-, KC-

(Provenance : Athesans 70 - 02.10.2025)



Lepra amara (Ach.) Hafellner, 2016 Synonyme: Pertusaria amara (Ach.) Nyl., 1873 Pertusariales - Pertusariaceae

Thalle blanchâtre.

Soralies blanches rondes souvent confluentes.

Goût amer.

Médulle C+ orangé, KG+ pourpre (fugace)

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025)





Lepraria incana (L.) Ach., 1803 - Lecanorales - Cladoniaceae

Sur écorce acide à l'ombre. Thalle pulvérulent granuleux. Blanchâtre à vert très pâle. Apothécies absentes. Thalle UV blanc.


(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Athesans 70 - 02.10.2025)



Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 1796 Lichen pulmonaire - Peltigerales - Peltigeraceae

Thalle vert, grand. Surface fortement réticulée. Soralies ou isidies sur les veines. Face inférieure brune tomenteuse à bosses glabres.

(Provenance : département 68 - 25.09.2025)



Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup, 2011 Lecanorales - Parmeliaceae


Thalle vert olive.

Très nombreuses isidies cylindriques simples à coralloïdes.

Face inférieure noire, brune au bord.

Apothécies rares à bord isidié.

(Provenance : Athesans 70 - 02.10.2025)



Melanohalea exasperatula
(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, 2004
Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle brun vert olive.

Très nombreuses isidies à base rétrécie (en spatule), creuses.

Face inférieure brune, plus pâle au bord.

Apothécies très rares.

Cortex et médulle K-, C-

(Provenance : Athesans 70 - 02.10.2025)



Parmelia ernstiae Feuerer & A. Thell, 2002 - Lecanorales - Parmeliaceae

Sur écorce, Thalle gris vert, extrémité tronquée, Pseudocyphelles blanches variables, Isidies nombreuses Face inférieure noire, rhizines noires Cortex K+ jaune, Médulle K+ jaune puis rouge.

(Provenances: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025 & Firstacker 68 - 03.10.2025)

Photo réalisée par Marc JOLY



Parmelia saxatilis (L.) Ach., 1803 - Lecanorales - Parmeliaceae

Sur rocher ou écorce.
Thalle gris vert, extrémité tronquée.
Pseudocyphelles blanches en trait.
Isidies cylindriques à coralloïdes.
Face inférieure noire, rhizines noires.
Cortex K+ jaune.
Médulle K+ jaune puis rouge.

(Provenance: Firstacker 68 - 03.10.2025)



Parmelia saxatilis (L.) Ach., 1803 - Lecanorales - Parmeliaceae

(Provenance: Firstacker 68 - 03.10.2025)



Parmelia sulcata Taylor, 1836 - Lecanorales - Parmeliaceae

Sur écorce.

Thalle gris vert, extrémité tronquée.

Pseudocyphelles blanches en trait.

Soralies granuleuses confluentes.

Face inférieure noire, rhizines noires.

Cortex K+ jaune.

Médulle K+ jaune puis rouge.

(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace - 03.10.2025)



# Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, 1952 - Lecanorales - Parmeliaceae

# Lichen foliacé:

Thalle vert clair, peu appliqué. Soralies marginales en ourlet. Face inférieure noire, brune au bord. Cortex K+ jaune, C-Médulle K+ jaune, C-

(Provenance : Athesans 70 - 02.10.2025)



Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, 1952 - Lecanorales - Parmeliaceae

(Provenance : Athesans 70 - 02.10.2025)



Peltigera canina (L.) Willd., 1787 Peltigère des chiens - Peltigerales - Peltigeraceae

Thalle gris, feutré sur presque toute la surface. Face inférieure blanche, veines blanchâtres. Rhizines courtes en buissons. Apothécies en selle brun rouge.

(Provenance : Levier 25 - 22.09.2025)



Peltigera hymenina (Ach.) Delise, 1830 - Peltigerales - Peltigeraceae

Thalle vert olive mat à gris.

Face inférieure blanche, brune au centre.

Veines brunes peu saillantes, plus claires au bord, absentes à la marge rhizines blanches, simples, courtes. Apothécies petites, rougeâtres.

(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Peltigera membranacea (Ach.) Nyl., 1887 - Peltigerales - Peltigeraceae

Thalle gris bleu, marge feutrée.

Face inférieure blanche, brune au centre.

Veines brunes saillantes.

Rhizines simples ou en écouvillon, blanchâtre, brunes au centre.

Apothécies brun rouge en selle.


(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace - 03.10.2025)



Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf, 1909 Peltigerales - Peltigeraceae

Thalle feutré au bord. Nombreuses isidies (coralloides) et phyllidies marginales. Face inférieure blanche veinée de brun. Rhizines simples blanches à brunes. Apothécies brun/rouge en selle.


(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Levier 25 - 22.09.2025)



Pertusaria pseudocorallina (Sw.) Arnold, 1887 Pertusariales - Pertusariaceae

Thalle gris épais.
Densément isidié.
K+ jaune puis rouge.
C-

(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.205)



Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg, 1977 Caliciales - Physciaceae

Thalle kaki, petit.

Corpuscules oranges dispersés dans la médulle (K+ pourpres).

Rhizines noires dépassant au bord.

Soralies terminales.

Apothécies absentes.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Physcia adscendens H. Olivier, 1882 - Caliciales - Physciaceae

Lobes bombés en capuchon, dressés.
Soralies surtout sous les lobes blanchâtres.
Longs cils blancs à noirs dépassant à la marge.
Face inférieure blanche.
Pas d'apothécies.
Cortex K+ jaune, médulle K-

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)

Photo réalisée par Marc JOLY



Physcia adscendens H. Olivier, 1882 - Caliciales - Physciaceae

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)

Photo réalisée par Marc JOLY



Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr., 1839 - Caliciales - Physciaceae

Thalle appliqué, ris maculé de blanc. Apothécies à disque brun pruineux. Face inférieure blanche. Rhizines noires fourchues. Cortex K+ jaune - Médulle K+ jaune.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr., 1839 - Caliciales - Physciaceae

Sur roches.

Thalle appliqué, gris bleuté maculé de blanc.

Soralies au centre du thalle.

Face inférieure blanchâtre.

Rhizines noires éparses.

Cortex K+ jaune

Médulle K+ jaune.

(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Physcia tenella (Scop.) DC., 1805 - Caliciales - Physciaceae

Lobes dressés plats.
Soralies au bord des lobes.
Longs cils foncés à l'extrémité.
Face inférieure blanche.
Pas d'apothécies.
Cortex K+ jaune.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Physcia tenella (Scop.) DC., 1805 - Caliciales - Physciaceae

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



# Physconia distorta (With.) J.R. Laundon, 1984 - Caliciales - Physciaceae

# Lichen foliacé:

Thalle vert humide, gris sec.
Bord des lobes grossièrement pruineux.
Pas de soralies.
Apothécies à disque brun.
Face inférieure noire, brune au bord.
Rhizines noires en écouvillon.
Cortex K- Médulle K-


(Provenance : Faverney 70 - 22.09.2025)



Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb., 1968 morph. glauca Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle gris vert peu appliqué. Isidies parfois coralloïdes marginales parfois laminales. Face inférieure brune à noire, parfois blanche (forme d'ombre) Cortex K+ jaune. Médulle K-, I+ indigo.

(Provenance : Faverney 70 - 22.09.2025)



Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy, 1929 Synonyme: Lecanora muralis (Schreb.) Rebenh., 1845 Lécanore des murs - Lécanore des murailles - Lecanorales - Lecanoraceae

Sur roche ou support artificiel. Thalle crustacé lobé, verdâtre. Apothécies ocres au centre du thalle. K-, C-, KC+ jaune pâle.

(Provenance : Nevache 05 - 02.06.2025)



Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, 1903 - Lecanorales - Parmeliaceae

#### Lichen fruticuleux:

Thalle en lanières plates.

Dessus gris vert.

Nombreuses isidies.

Face inférieure noire canaliculée.

(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Firstacker 38 - 03.10.2025)



Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, 1903 - Lecanorales - Parmeliaceae

(Provenances : La Mer 70 - 21.09.2025 & Firstacker 68 - 03.10.2025)



Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, 2007 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle gris vert.

Pseudocyphelles blanches.

Soralies punctiformes marginales.

Face inférieure brune à la marge, plus claire au centre.

Cortex K + jaune, Médulle K-, C + rouge.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)

(Espèce dédiée au botaniste français A. JECKER)



Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog, 1982 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle gris vert.

Pseudocyphelles blanches.

 $Soralies\ punctiformes\ laminales.$ 

Face inférieure brune à la marge, plus claire au centre.

Cortex K+ jaune.

Médulle K-, C+ rouge.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae

Thalle en lanières plates étroites pendantes, vert jaune sur les 2 faces. Soralies arrondies marginales. Apothécies rares.


(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025)



Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae

Thalle dressé en lanières plates gris vert larges jusqu'à 5mm, ridées alvéolées, +/- creuses. Apothécies terminales. Ni soralies, ni isidies.

(Provenance : Faverney 70 - 22.09.2025)




# Rhizocarpon geographicum (L.) DC., 1805 Ordre non indiqué dans l'INPN (en principe : Lecanorales) Famille : Rhizocarpaceae

#### Lichen crustacé:

Sur roches silicatées. Thalle jaune, aréolé, délimité par une ligne hypothalline noire. Apothécies et lignes +/- anguleuses. Médulle K-

(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



# Rhizocarpon lecanorinum Anders, 1923 Ordre non indiqué dans l'INPN (en principe : Lecanorales) Famille : Rhizocarpaceae

#### Lichen crustacé:


Sur roches.

Thalle jaune, aréolé, délimité par une ligne hypothalline noire.

Apothécies et lignes arrondies.

Médulle K+ jaune.


(Provenance ? - 22.09.2025)



Usnea dasypoga (Ach.) Nyl., 1876 Synonyme: Usnea filipendula Stirt., 1881 Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle pendant, tendre, à rameaux à section ronde, fins, divisés par 2, allongés. Nombreuses fibrilles. Papilles et soralies. Pas d'apothécies.

(Provenance : Levier 25 - 22.09.2025)



Usnea florida (L.) F.H. Wigg., 1780 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle dressé en lanières à section ronde, divisées.

Nombreuses fibrilles et tubercules.

Apothécies grandes à disque bordé de nombreuses fibrilles.

Disque des apothécies K + jaune.

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Usnea florida (L.) F.H. Wigg., 1780 - Lecanorales - Parmeliaceae

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Usnea florida (L.) F.H. Wigg., 1780 - Lecanorales - Parmeliaceae

(Provenance : La Mer 70 - 21.09.2025 & Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Usnea perplexans Stirt., 1881 Synonyme sur étiquette : Usnea lapponica Vain, 1925 Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle dressé non pendant.

Diam des rameaux diminuant progressivement de bas en haut.

Présence de fibrilles, papilles et soralies rongeantes.

Extrémités fines et sinueuses.

(Provenances: La Mer 70 - 21.09.2025 & Levier 25 - 22.09.2025)



Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale, 1974 Lecanorales - Parmeliaceae

Sur pierre non calcaire.
Thalle vert jaunâtre, adhérent.
Isidies +/- abondantes cylindriques coralloïdes.
Apothécies à disque brun rouge au centre du thalle.
Médulle K + jaune puis orangé, P + orange.

(Provenance : Athesans 70 - 26.09.2025)



Xanthoparmelia loxodes
(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch, 2004
Lecanorales - Parmeliaceae

Sur pierre, rocher. Thalle brun vert olive, plissé ridé. Isidies en paquets, érodées en soralies blanches. Face inférieure noire, quelques rhizines noires.

(Provenance: Firstacker 68 - 03.10.2025)



Xanthoparmelia protomatrae (Gyeln.) Hale, 1974 Lecanorales - Parmeliaceae

Ni soralies, ni isidies.
Thalle verdâtre.
Sur roche.
K+ jaune puis brun, C- (médulle)
Cortex K-, C-

(Provenance : Faverney 70 - 22.09.2025)



Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw., 2005 Lecanorales - Parmeliaceae

Sur roche siliceuse.
Thalle vert jaunâtre, adhérent.
Ni soralies, ni isidies.
Apothécies à disque brun rouge au centre du thalle.
Médulle K+ jaune puis orangé, C-

(Provenance: Ballon d'Alsace 68 - 03.10.2025)



Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 1860 Lichen encroûtant jaune - Parmélie des murailles Teloschistales - Teloschistaceae

Thalle jaune, lobes arrondis. Apothécies nombreuses à disque jaune. Face inférieure blanche. Cortex K+ rouge.

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)



Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 1860 Lichen encroûtant jaune - Parmélie des murailles Teloschistales - Teloschistaceae

(Provenance : Athesans 70 - 25.09.2025)