

QUELQUES ESPECES INTÉRESSANTES RECOLTEES EN 1997

Roland BANNWARTH

MAI : Battenheim 68390 (CN-rc 3780B) - Forêt de la Harth - alt. 220 m. - taux d'humidité du terrain : moyen.

Strate arborescente : chêne, charme (quelques enclaves de Pins)

Entoloma clypeatum fo. palidochryseum - Noord.
Neolentinus lepideus [(Buxb.): Fr.] Redhead & Ginns (= *Lentinus squamosus*)
Volvariella murinella (Quél.) Moser

JUIN : Forêt entre Burnhaupt-le-Bas et Gildwiller 68210 (CN-rc 3620D /21B) - alt. 300 m. - taux d'humidité du terrain : moyen.

Strate arborescente : hêtre, chêne, charme, bouleau, épicéa.

Russula urens - Romell. (= *R. adulterina* auct.)

JUILLET : Grand-Ventron 68820 Kruth - alt. 1100 m. - (CN-rc 3619C)
taux d'humidité du terrain : moyen.

Boletus pulverulentus Opatowski
Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr.
Cortinarius malicorius Fr.
Cortinarius rigens (Pers.: Fr.) Fr.
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél.
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb.
Scutiger ovinus (Sch.: Fr.) Murill

AOÛT : Forêt de Murbach 68530 - Saint-Barnabé - alt. 750 m. (CN-rc 3780D) - terrain sec.

Strate arborescente : sapin de Douglas, châtaigner, charme, chêne, épicéa.

Strate arbustive : houx, genêt.
Strate herbacée : digitale jaune et rouge.

Boletus appendiculatus Sch.
Cantharellus amethysteus Quéél.
Lactarius glaucescens Crossland

SEPTEMBRE : Osenbuhr près Gueberschwyr 68420 - Forêt du Herrenwald - alt. 560 m. -
(CN-rc 3619A) - taux d'humidité du terrain : moyen.

Strate arborescente : hêtraie-sapinière, chêne, châtaigner, bouleau
Strate arbustive : sureau, noisetier, troène.

Cantharellus amethysteus Quéél.
Cortinarius cinnamomeoluteus var. *porphyrovelatus* (Moser) Garnier
Cortinarius malicorius Fr.
Cotylidia pannosa (Sow.: Fr.) Reid. (= *Thelephora pallida* Pers. ex Fr.)
Entoloma sericeonitidum (Orton) Noord. (= *undatus* ss. Lge.)
Leccinum piceinum Pilat & Dermek.
Leucopaxillus albissimus (Peck) Sing. [= *L. cerealis* (Lasch.:Fr.)]
Macrolepiota konradii (Huijsm. ex Orton) Moser
Neolentinus adhaerens (Alb. & Schw.: Fr.) Redhead & Ginns (= *Lentinus* ad.)
Russula raoultii Quélet.

Wattwiller 68700 - forêt autour du camping "Relais des Sources" - alt. 400 m. -
(CN-rc 3620B) - taux d'humidité du terrain : moyen.

Strate arborescente : épicéa, hêtre, chêne, bouleau, châtaigner.

Boletus rhodoxanthus (Krb.) ex Kallenb.
Leccinum versipelle (Fr.) Snell (= *L. testaceoscabrum*)
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb.
Russula parazurea J. Schaef.
Suillus placidus (Bonord.) Sing.
Xerocomus pulverulentus Opat.

Bourbach-le-Bas 68290 - Lierenbuckel - forêt du Silbachwaeldele- alt. 450 m.
(CN-rc 3620D) - terrain sec.

Strate arborescente : hêtre, épicéa, charme, pin, bouleau, chêne, merisier.
Strate arbustive : cornouiller sanguin, ronce.

Cantharellus amethysteus - Quéél.
Panellus serotinus (Hoffm.: Fr.) Kühn.
Tricholoma argyraceum (Bull.) Gill.

OCTOBRE : Guewenheim 68116 - Forêt vers Soppe-le-Bas - alt. 340 m.

(CN-rc 3620D) - taux d'humidité du terrain : moyen.

Strate arborescente : épicéa, hêtre, chêne, bouleau, charme

Strate arbustive : sureau

Strate herbacée : violette, anémone sylvie

Psathyrella maculata (Parker) Moser

Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. (= *Boletus versicolor* auct.)

Wolschwiller 68480 - Eichwald - Glätzer - Langrund - Hoheschleife -
Langematten - alt. 600 m. (CN-rc 3722B) - taux d'humidité du terrain : moyen.

Strate arborescente : hêtraie-sapinière, pinède, bouleau.

Cortinarius calochrous var. *coniferarum* Moser

Cortinarius humicola (Quél.) Maire

Cortinarius infractus var. *obscurocyaneus* (Secr.)

Cortinarius salor Fr.

Geastrum sessile (Sow.) Pouz. (= *G. fimbriatum*)

Mycena renati Quél. (= *M. flavipes* = *M. luteoalcalina*)

Albatrellus cristatus (Pers.: Fr.) Kolt. & Pouz.

Suillus tridentinus (Bresadola) Singer

Tremiscus helvelloides (De Cand.: Fr.) Donk. (= *Guepinia* h.)

Tricholoma basirubens (Bon) Riva & Bon

Tricholoma vaccinum var. *fulvosquamosum* Bon

