

Quelques espèces remarquables récoltées en 1997



Tricholoma vaccinum
var. fulvosquamosum

Bon

Cette espèce, à chapeau brunâtre, moins mamelonné que le type, laisse apparaître de belles squames concentriques bien nettes. De tendance plutôt thermophile, elle a malgré tout été découverte sur sol calcaire dans le Jura Alsacien.

Suillus tridentinus

(Bres.) Sing.

Cèpe du Trentin

Ce remarquable *Suillus*, comestible agréable, n'est pas très commun dans l'Est. Il se trouve de préférence en montagne où il peut monter jusqu'à 2500 mètres. Son chapeau couvert d'un gluten "abricot", ses pores amples d'un orange vif, le distinguent aisément des autres *Suillus*.

Sur terrain calcaire, altitude 380 mètres.

Sous Mélèzes (*Larix decidua*).



Tricholoma basirubens

(Bon) Riva & Bon

Ce tricholome, contrairement à son presque semblable *Tricholoma orirubens*, rougit nettement à la base du stipe. De la section des "*Terrea*" cette espèce, plutôt thermophile, a été récoltée dans une hêtraie calcaire du Jura Alsacien.

Bon comestible, il est néanmoins préférable de le délaissier car peu commun dans notre région.

REMARQUE :

Ces trois espèces ont été récoltées le 19 octobre 1997 dans la forêt de WOLSCHWILLER à 350 mètres d'altitude sur terrain calcaire.